

TD17

## Fonctions de plusieurs variables sur $\mathbb{R}^n$

### Fonctions de plusieurs variables, continuité

#### Exercice 17.1 (★)

Pour chaque fonction ci-dessous, déterminer les lignes de niveau  $\lambda$  pour  $\lambda \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$  et les représenter graphiquement. En déduire la représentation graphique de la fonction.

$$(x, y) \mapsto 2x + y + 1 \quad ; \quad (x, y) \mapsto x^2 \quad ; \quad (x, y) \mapsto xy \quad ; \quad (x, y) \mapsto 2 \sin(\sqrt{x^2 + y^2}).$$

Vérifier les lignes de niveau et la représentation graphique de la fonction en utilisant `Python`.

#### Exercice 17.2 (★★)

Étudier la continuité de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^3$  par :

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \sin(x^2 + y^2 + z^2), & \text{si } (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

### Calcul différentiel

#### Exercice 17.3 (★)

Pour chacune des fonctions suivantes, montrer qu'elle est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur son ensemble de définition, et calculer son gradient.

$$\left. \begin{array}{l} f_1 : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) & \mapsto e^{xyz} \end{cases} ; \\ f_2 : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) & \mapsto \frac{y \exp(z^2)}{x^2 + x + 1} \end{cases} \end{array} \right| \begin{array}{l} f_3 : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto \ln(x^2 + y^2 + 1) \end{cases} ; \\ f_4 : \begin{cases} \mathbb{R}^n & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) & \mapsto (x_1^2 + \dots + x_n^2) e^{-(x_1^2 + \dots + x_n^2)} \end{cases} \end{array}$$

#### Exercice 17.4 (★★)

Soit  $f$  une fonction continue sur  $\mathbb{R}$  et soit  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $g(x, y) = \int_x^{xy} f(t) dt$ .

Montrer que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^2$  et déterminer ses dérivées partielles.

#### Exercice 17.5 (★)

Soit  $f : (x, y) \mapsto (x - y)^2 + x^3 + y^3$ .

1. Justifier l'existence et écrire le développement limité à l'ordre 1 de la fonction  $f$  en un point  $(a, b)$  quelconque.
2. Déterminer l'équation du plan affine tangent au graphe de  $f$  aux points  $(0, -1)$ ,  $(0, 0)$  et  $(-1, -1)$ .
3. Tracer le graphe de  $f$  ainsi que les plans tangents aux points  $(0, -1)$ ,  $(0, 0)$  et  $(-1, -1)$  à l'aide du logiciel `Python`.

**Exercice 17.6 (★★)**

Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^3$ , et soit  $F$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^3$  par  $F(x, y, z) = f(x - y, y - z, z - x)$ .

1. Soit  $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ . Montrer que la fonction

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto f(x - y_0, y_0 - z_0, z_0 - x) \end{cases}$$

est dérivable en  $x_0$  et déterminer  $\varphi'(x_0)$ . Que peut-on en déduire sur la dérivée partielle d'ordre 1 par rapport à  $x$  de  $F$  ?

2. Montrer que pour tout  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ , on a :

$$\partial_1(F)(x, y, z) + \partial_2(F)(x, y, z) + \partial_3(F)(x, y, z) = 0.$$

**Exercice 17.7 (★★ - Gradient et lignes de niveau)**

Soit  $f(x, y) = (y - x^2)^3 - 1$ .

1. Montrer que les lignes de niveau de  $f$  sont des paraboles.
2. Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ , et déterminer ses dérivées partielles.
3. Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . On note  $\mathcal{C}_\lambda$  la ligne de niveau  $\lambda$  de  $f$ . Soit  $(x_0, y_0) \in \mathcal{C}_\lambda$ .
  - (a) Déterminer un vecteur directeur de la tangente à  $\mathcal{C}_\lambda$  en  $(x_0, y_0)$ .
  - (b) Montrer que ce vecteur est orthogonal à  $\nabla f(x_0, y_0)$ .
4. Vérifier ce résultat à l'aide du logiciel Python, en traçant sur un même graphique les lignes de niveau et le champ de gradients de  $f$ .

**Recherche d'extremum**

**Exercice 17.8 (★)**

1. Soit  $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^2 + 2x + 3y^2 - 6y + 1$ .
  - (a) Représenter le graphe de  $f$  à l'aide de Python. Déterminer graphiquement le(s) point(s) critique(s) de  $f$ . Quel est la nature de ce(s) point(s) critique(s) ?
  - (b) Vérifier ces résultats par le calcul.
2. Mêmes questions pour  $g : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^3 + y^3 - 3xy + 1$ .

**Exercice 17.9 (★)**

Déterminer les points critiques et les extrema éventuels des fonctions suivantes :

$$f_1 : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) & \mapsto \frac{x^2}{2} + xyz + y - z \end{cases} ; \quad \left| \quad f_2 : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) & \mapsto xyz + xy + yz + xz \end{cases}$$

**Exercice 17.10 (★★)**

Dans la suite, on considère deux fonctions  $f$  et  $h$  définies respectivement sur  $\mathbb{R}^2$  et  $\mathbb{R}$  par

$$f(x, y) = 2e^{-x} + 3x^2 - 2xy + y^2 \quad \text{et} \quad h(x) = 2e^{-x} + 2x^2.$$

1. Montrer que l'équation  $e^{-x} - 2x = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  sur  $\mathbb{R}$ .
2. Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et admet un unique point critique.
3. Montrer que pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) \geq h(x)$ .

4. Étudier les variations de  $h$  et en déduire que  $f$  admet un minimum, et exprimer ce minimum en fonction de  $\alpha$ .

**Exercice 17.11 (★★)**

Déterminer si les fonctions suivantes admettent ou non des extrema, et déterminer l'ensemble des points où ces extrema sont atteints.

$$\begin{array}{l}
 f_1 : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto x^4 - 4x^2y^2 + 4y^4 ; \end{cases} \\
 f_2 : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto x^2 + xy + y^2 ; \end{cases} \\
 f_3 : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto -2x^2 - 2xy - 3y^2 - 4 ; \end{cases} \\
 f_4 : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) & \mapsto \frac{x^2}{2} + y^2 + 2z^2 - xy - xz + x^4. \end{cases}
 \end{array}$$

**Exercice 17.12 (★★ - Étude d'un extremum par variation de fonctions)**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^2$  par  $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$ .

1. Montrer que  $f$  n'admet pas de maximum.
2. On se propose de montrer que  $f$  possède un minimum.
  - (a) En considérant  $f(-x, -y)$ , montrer qu'on peut se restreindre à  $y \geq 0$ .
  - (b) Pour  $y \geq 0$  fixé, montrer que la fonction  $x \mapsto f(x, y)$  admet un minimum noté  $g(y)$ .
  - (c) Étudier les variations de  $y \mapsto g(y)$  et en déduire que  $f$  admet un minimum, et préciser le(s) point(s) où ce minimum est atteint.

**Exercice 17.13 (★★)**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^2$  par  $f(x, y) = \frac{xy}{(1+x^2)(1+y^2)}$ .

1. Montrer que  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  et déterminer son gradient.
2. Montrer que  $(0, 0)$  est un point critique de  $f$  et que  $f$  admet quatre autres points critiques, de la forme  $(a, b)$ ,  $(-a, b)$ ,  $(a, -b)$ ,  $(-a, -b)$ , avec  $a > 0, b > 0$ .
3. Déterminer la nature du point critique  $(0, 0)$ .
4. On souhaite étudier la nature de  $(a, b)$ . Pour cela, on cherche à déterminer le signe de  $f(x, y) - f(a, b)$ .
  - (a) Soit  $y \in \mathbb{R}$  fixé. Montrer que  $f(x, y) - f(a, b) = \frac{P(x, y)}{4(1+x^2)(1+y^2)}$  où  $x \mapsto P(x, y)$  est un polynôme de degré 2 dont on calculera son discriminant  $\Delta(y)$ .
  - (b) Montrer que la fonction  $\Delta$  est de signe constant.
  - (c) Conclure.
5. Déterminer de même la nature des trois autres points critiques.
6. Dresser le tableau de variations de  $g : t \mapsto \frac{t}{1+t^2}$ . Retrouver alors les résultats précédents.

**Exercice 17.14 (★★)**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^3$  par

$$f(x, y, z) = (x + y + z)e^{-\frac{1}{6}(x^2+y^2+z^2)}$$

1. Montrer que  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^3$  et déterminer ses points critiques.
2. Montrer que pour tout  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ,  $|x + y + z| \leq \sqrt{3}\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ .
3. En étudiant la fonction définie sur  $\mathbb{R}_+$  par  $h(t) = \sqrt{t}e^{-t/6}$ , déterminer la nature des points critiques de  $f$ .

**Exercice 17.15 (★★★)**

Soit  $a$  et  $b$  deux vecteurs non colinéaires de  $\mathbb{R}^n$  ( $n \geq 2$ ) et  $f$  la fonction définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad f(x) = \langle x, a \rangle^2 + \langle x, b \rangle^2.$$

1. Justifier que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et calculer les dérivées partielles de  $f$ . En déduire une expression du gradient de  $f$ .
2. Déterminer l'ensemble des points critiques de  $f$ .
3. Étudier les extrema de  $f$ .

**Exercice 17.16 (★★★)**

Soit  $n \geq 1$  et soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^n$  par :

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \left(1 - \sum_{i=1}^n x_i\right)^2.$$

1. Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^n$  et qu'elle possède un unique point critique  $a = (a_1, \dots, a_n)$ .
2. Pour  $(h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ , expliciter  $f(a_1 + h_1, \dots, a_n + h_n) - f(a_1, \dots, a_n)$ , et en déduire la nature du point critique  $a$ .

**Exercice 17.17 (★★★★ - Fonctions convexes sur  $\mathbb{R}^n$  - Oral ESCP 2001 - 🐦)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq 2$ . L'espace vectoriel  $\mathbb{R}^n$  est muni de sa structure euclidienne canonique, le produit scalaire étant noté  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  et la norme associée  $\| \cdot \|$ .

Soit  $f$  une application de classe  $\mathcal{C}^1$  définie sur  $\mathbb{R}^n$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , convexe, c'est-à-dire vérifiant pour tout  $(x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$  et pour tout réel  $\lambda \in [0, 1]$  :

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

Pour tout  $(h, x) \in (\mathbb{R}^n)^2$  fixé, on définit la fonction  $\varphi_{h,x}$  de la variable réelle  $t$  par :

$$\varphi_{h,x}(t) = f(x + th).$$

1. (a) Montrer que  $\varphi_{h,x}$  est une fonction convexe de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .  
(b) En déduire que  $\varphi'_{h,x}(0) \leq \varphi_{h,x}(1) - \varphi_{h,x}(0)$ .
2. Montrer que pour tout  $(x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$ , on a

$$\langle \nabla f(x), y - x \rangle \leq f(y) - f(x).$$

3. On suppose dans cette question que  $f(0) = 0$  et que  $\nabla f(0) = 0$ . On suppose également que  $f$  est strictement convexe, c'est-à-dire qu'elle vérifie pour tout  $(x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$  tels que  $x \neq y$ , pour tout réel  $\lambda \in ]0, 1[$  :

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) < (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $f(0) \leq f(x)$ , puis que si  $x \neq 0$ , alors  $f(x) \neq 0$ .