

— TD20 —

## Fonctions de plusieurs variables sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$

### Éléments de topologie de $\mathbb{R}^n$

#### Exercice 20.1 (★)

Les ensembles suivants sont-ils ouverts ?

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, xyz \neq 0\}; B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 2x^2y - 5z < 3 \text{ ou } |z| > 2\}$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| \neq 1 \text{ et } y \neq 1\}; D = \mathbb{R}^n \setminus \{(a_1, \dots, a_n)\}.$$

### Fonctions $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$

#### Exercice 20.2 (★)

On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x, y) = \ln(1 + xy)$ .

1. Déterminer son ensemble de définition  $\Omega$  et montrer que c'est un ouvert.
2. Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\Omega$  et déterminer son gradient et sa hessienne en tout point de  $\Omega$ .
3. Justifier l'existence et déterminer le développement limité à l'ordre 2 de  $f$  en  $a = (1, 1)$ .

#### Exercice 20.3 (★★★★)

Soit la fonction  $f : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$ .

1. Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et déterminer ses dérivées partielles premières.
2. Calculer  $\partial_{1,2}^2 f(0, 0)$  et  $\partial_{2,1}^2 f(0, 0)$ .  $f$  est-elle de classe  $\mathcal{C}^2$  ?

### Recherche d'extrema sur un ouvert

#### Exercice 20.4 (★)

Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$ , et  $a \in \mathbb{R}^n$  un point critique de  $f$ . Notons  $A = \nabla^2 f(a)$ . Conclure si possible sur la nature local de  $a$  dans les cas suivants :

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\text{Spec}(A) = \{1, 2\}</math></li> <li>• <math>\text{Spec}(A) = \{2, -2\}</math></li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\text{Spec}(A) = \{0, -2, -6\}</math></li> <li>• <math>\text{Spec}(A) = \{-2, 0, 2\}</math></li> </ul> |
|---|--|---|

#### Exercice 20.5 (★)

Considérons la fonction  $f : (x, y) \mapsto x^3 + xy + y^3$ .

1. Représenter graphiquement cette fonction à l'aide de Python.
  2. Déterminer les points critiques de la fonction  $f$ .
  3. Déterminer graphiquement la nature de ces points critiques. Vérifier ces résultats par le calcul.
  4. Déterminer les vecteurs propres de la hessienne de  $f$  en le point col. Pouvez vous retrouver graphiquement ces vecteurs ?
- 

**Exercice 20.6 (★★)**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\Omega = ]0, 1[ \times ]0, 1[$  par  $f(x, y) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} + \frac{1}{x+y}$ .

1. Montrer que  $f$  est  $\mathcal{C}^2$  sur l'ouvert  $\Omega$ , et calculer ses dérivées partielles premières et secondes.
  2. Déterminer les points critiques de  $f$ .
  3. Montrer que  $f$  admet un extremum local sur  $\Omega$ .
- 

**Exercice 20.7 (★★)**

Étudier les extrema locaux des fonctions suivantes et préciser s'il s'agit d'extrema globaux. On pourra s'aider de Python (représentation graphique de la fonction, valeurs propres de la hessienne).

$$f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - 2(x - y)^2 ; \quad f : (x, y) \mapsto x((\ln x)^2 + y^2)$$

$$f : (x, y, z) \mapsto 2x^2 - 4x + y^2 + 2y + z^2 - 2xz ; \quad f : (x, y, z) \mapsto xy + yz + zx - xyz$$


---

**Exercice 20.8 (★★)**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^3$  par  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xyz$ .

1. Justifier que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$ , et calculer ses dérivées partielles d'ordre 1 et 2.
  2. Montrer que  $f$  admet exactement cinq points critiques, dont le point  $(0, 0, 0)$ .
  3. Déterminer la matrice hessienne de  $f$  en  $(0, 0, 0)$ , et en déduire que  $f$  possède un minimum local en  $(0, 0, 0)$ . Est-ce un minimum global de  $f$  ?
  4. Pour chacun des autres points critiques, vérifier que 4 est valeur propre de la matrice hessienne, et déterminer si  $f$  admet ou non un extremum local en ce point.
- 

**Exercice 20.9 (★★ - EML ECE 2014)**

On note  $\varphi : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par  $\varphi(t) = e^t - te^{\frac{1}{t}}$ . On note  $U = \mathbb{R} \times ]0, +\infty[$  et  $f$  la fonction définie sur  $U$  par

$$f(x, y) = xy - e^x \ln(y).$$

1. Montrer l'équivalence :  $\varphi(t) = 0 \Leftrightarrow t - \ln(t) - \frac{1}{t} = 0$ .

En déduire que l'équation  $\varphi(t) = 0$  possède une unique solution que l'on déterminera.

2. Montrer que  $f$  est  $\mathcal{C}^2$  sur  $U$  et déterminer ses dérivées partielles premières et secondes.
3. Montrer que  $(x, y)$  est un point critique de  $f$  si et seulement si :

$$x > 0, y = e^{\frac{1}{x}} \text{ et } \varphi(x) = 0.$$

4. En déduire que  $f$  admet un unique point critique sur  $U$ .
5.  $f$  admet-elle un extremum local sur  $U$  ?

### Exercice 20.10 (★)

Soit  $f : (x, y) \mapsto x^2 + y^2 + 2xy + xy^3$ .

1. Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$  et qu'elle admet un unique point critique.
2. Déterminer les valeurs propres de la hessienne en ce point critique. Peut-on conclure quant à la nature de ce point critique ?
3. Étudier les signes de  $f(x, x)$  et  $f(x, -x)$ , et conclure.

### Exercice 20.11 (★★)

Soit la fonction  $f$  définie sur  $(\mathbb{R}_+^*)^3$  par  $f(x, y, z) = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x}$ .

1. (a) Vérifier que  $f$  possède une infinité de points critiques, et que ceux-ci sont les points de la forme  $A_a = (a, a, a)$ , où  $a$  est un réel strictement positif quelconque.  
 (b) Déterminer la matrice  $M$  de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  telle que  $\nabla^2(f)(A_a) = \frac{1}{a^2}M$ , puis déterminer les valeurs propres de  $M$ . En déduire alors celles de  $\nabla^2(f)(A_a)$ .  
 (c) Cela permet-il de conclure quant à l'existence d'un extremum local de  $f$  sur  $(\mathbb{R}_+^*)^3$  ?
2. (a) Soit  $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ . Montrer que pour tout réel  $z$  strictement positif, on a :

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq \frac{x}{y} + 2\sqrt{\frac{y}{x}}.$$

- (b) En étudiant la fonction  $t \mapsto t + \frac{2}{\sqrt{t}}$  sur  $]0, +\infty[$ , montrer que pour tout  $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ , on a :

$$\frac{x}{y} + 2\sqrt{\frac{y}{x}} \geq 3.$$

- (c) Que peut-on alors conclure ?

### Exercice 20.12 (★★)

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = \left(1 + y + xy - \frac{x^2}{2}\right) e^y$ .

1. Montrer que  $f$  est  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$ , déterminer ses dérivées partielles premières et secondes.
2. Montrer que  $f$  admet un unique point critique  $(\alpha, \beta)$ .

- Vérifier que la détermination des valeurs propres de  $\nabla^2 f(\alpha, \beta)$  ne suffit pas à déterminer la nature de ce point critique.
- Déterminer un vecteur propre  $u$  de  $\nabla^2 f(\alpha, \beta)$  associé à la valeur propre 0.
- En étudiant la fonction  $t \mapsto f((\alpha, \beta) + tu)$ , déterminer la nature du point critique  $(\alpha, \beta)$ .

### Exercice 20.13 (★★ - Position du graphe par rapport à l'hyperplan tangent - )

Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  sur un ouvert  $U$  de  $\mathbb{R}^n$ . Soit  $a \in U$ .

On note  $q_a$  la forme quadratique associée à la matrice hessienne  $\nabla^2(f)(a)$ .

On considère la fonction  $g$  définie pour tout  $x \in U$  par :

$$g(x) = f(x) - f(a) - \langle \nabla(f)(a), x - a \rangle.$$

- Montrer que  $g(a) = 0$ , que  $a$  est un point critique de  $g$  et que  $\nabla^2(g)(a) = \nabla^2(f)(a)$ .
- En déduire les résultats suivants :
  - Si  $\text{Sp}(\nabla^2(f)(a)) \subset \mathbb{R}_+^*$ , alors le graphe de  $f$  se situe localement au-dessus de l'hyperplan tangent en  $a$ .
  - Si  $\text{Sp}(\nabla^2(f)(a)) \subset \mathbb{R}_-^*$ , alors le graphe de  $f$  se situe localement au-dessous de l'hyperplan tangent en  $a$ .
  - Si  $\nabla^2(f)(a)$  possède des valeurs propres non nulles de signes contraires, alors le graphe de  $f$  traverse l'hyperplan tangent au voisinage de  $a$ .

Quel résultat sur les fonctions convexes d'une variable réelle peut-on alors généraliser ?

3. **Application.** Soit  $f : (x, y) \mapsto x^3 + y^3$ .

- Étudier localement la position relative du graphe de  $f$  par rapport à son hyperplan tangent en  $(1, 1)$ ,  $(-1, -1)$  et  $(-1, 1)$ .
- Python.** Représenter le graphe de  $f$  ainsi que les plans tangents en ces trois points. Vérifier graphiquement les résultats de la question précédente.

### Exercice 20.14 (★★★ - Notations de Monge - )

On suppose que  $f$  est une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $U$ , un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ .

Soit  $a \in U$  un point critique de  $f$ .

On note :  $r = \partial_{1,1}^2(f)(a)$ ,  $t = \partial_{2,2}^2(f)(a)$  et  $s = \partial_{1,2}^2(f)(a)$  de sorte que  $\nabla^2(f)(a) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$ .

- On note  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  les valeurs propres de  $\nabla^2(f)(a)$  (non nécessairement distinctes). Montrer que  $rt - s^2 = \lambda_1 \lambda_2$  et  $r + t = \lambda_1 + \lambda_2$ .
- En déduire le résultat suivant :
  - Si  $rt - s^2 > 0$  et  $r > 0$  alors  $f$  admet un minimum local en  $a$ .
  - Si  $rt - s^2 > 0$  et  $r < 0$  alors  $f$  admet un maximum local en  $a$ .
  - Si  $rt - s^2 < 0$  alors  $a$  est un point selle de  $f$ .
- Python.** Écrire une fonction qui prend en entrée une matrice symétrique  $2 \times 2$  et qui renvoie la nature du point critique correspondant.

4. **Application.** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$ .
- Montrer que  $f$  est  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$  et calculer les dérivées partielles premières et secondes.
  - Montrer que  $f$  admet quatre points critiques et les déterminer.
  - Sans calculer de valeurs propres, déterminer les extrema locaux de  $f$ .

### Exercice 20.15 (★★★★ - Équation des ondes en dimension 1 - Oral HEC 2017)

1. Soient  $a$  et  $b$  deux applications de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

Soit  $f$  l'application de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  telle que, pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$f(x, y) = \frac{1}{2} \left[ a(x+y) + a(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} b(s) ds \right].$$

Justifier que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$  et montrer que  $\partial_{1,1}^2(f) - \partial_{2,2}^2(f)$  est l'application nulle.

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , préciser les valeurs de  $f(x, 0)$  et de  $\partial_2(f)(x, 0)$ .

2. Dans cette question,  $f$  désigne une application de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  qui est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

- (a) Montrer qu'il existe une unique application  $g$  de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  telle que pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$f(x, y) = g(x+y, x-y).$$

Dans la suite, on admettra que l'application  $g$  ainsi définie est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

- (b) Si  $g$  désigne l'application définie au a), montrer que pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$\partial_{1,1}^2(f)(x, y) - \partial_{2,2}^2(f)(x, y) = 4\partial_{1,2}^2(g)(x+y, x-y).$$

- (c) En déduire que si  $\partial_{1,1}^2(f) - \partial_{2,2}^2(f)$  est l'application nulle et que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x, 0) = \partial_2(f)(x, 0) = 0$ , alors  $f$  est l'application nulle.

3. (a) Montrer qu'il existe une unique application  $f$  de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  qui est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$  telle que  $\partial_{1,1}^2(f) - \partial_{2,2}^2(f)$  soit l'application nulle et que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x, 0) = x^2$  et  $\partial_2(f)(x, 0) = x$ , et déterminer cette application.

- (b) Étudier les extremums de  $f$ .

## Extrema des fonctions convexes sur $\mathbb{R}^n$

### Exercice 20.16 (★★)

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^n$  par :

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n x_k^2 + \left( 1 - \sum_{k=1}^n x_k \right)^2.$$

- Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^n$  et calculer ses dérivées partielles d'ordre 1 et 2.
- Montrer que  $f$  admet un unique point critique  $a = (a_1, \dots, a_n)$ . On note  $A = \nabla^2 f(a) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

3. Déterminer les valeurs propres de  $A$ . En déduire que  $f$  admet un extremum local en  $a$ .
  4. Montrer que  $f$  admet en fait un extremum global en  $a$ .
- 

**Exercice 20.17 (★★★★ - QSP HEC 2016)**

Soit  $p \in \mathbb{N}^*$ ,  $E$  un espace euclidien et  $(u_1, \dots, u_p) \in E^p$ .

Montrer que la fonction  $f : x \mapsto \sum_{k=1}^p \|x - u_k\|^2$  admet un minimum global sur  $E$  et le calculer.

---